

## *Gestion de l'équipement de protection de personne et du transport*

- Transfert du patient COVID-19 instable avec assistance ventilatoire invasive (patient intubé)

**Concerne les professionnels médico-infirmiers qui interviennent potentiellement dans les soins au patient pendant le transfert (injection, ventilation p.ex)**

Pratiquer l'hygiène des mains

Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la protection oculaire & la surblouse

Rester à la tête du patient

Ne rien toucher dans l'environnement hospitalier pendant le transport

**Une fois arrivés à destination et après installation du patient :** pratiquer l'hygiène des mains ; le maintien / changement / retrait de la surblouse, du masque et de la protection oculaire sont à évaluer selon les besoins auprès du patient

- En cas de retour prévu avec le patient (après un examen p.ex), prévoir une surblouse de rechange en tous les cas

**Concerne le collaborateur (brancardier\* ou médico-soignant) en soutien au transport**

Rester en tenue professionnelle habituelle

Maintenir le masque médical en place

Pratiquer l'hygiène des mains au besoin (lorsque les mains passent du lit vers l'environnement hospitalier au moins)

Rester au pied du lit

Conduire le lit, commander l'ascenseur et l'ouverture des portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)

\* Le brancardier ne rentre pas en chambre

## *Gestion de l'équipement de protection de personne et du transport*

- Transfert du patient COVID-19 instable ou avec ventilation non invasive (VNI; CPAP; **OHD**)

**Concerne les professionnels médico-infirmiers qui interviennent dans les soins au patient pendant le transfert (injection, ventilation p.ex)**

Pratiquer l'hygiène des mains

Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la protection oculaire & la surblouse

Mettre un masque médical

- au patient instable non ventilé
- **au patient sous oxygénothérapie à haut débit (OHD)**

Rester à la tête du patient

Ne rien toucher dans l'environnement hospitalier pendant le transport

**Une fois arrivés à destination et après installation du patient** : pratiquer l'hygiène des mains ; le maintien / changement / retrait de la surblouse, du masque et de la protection oculaire sont à évaluer selon les besoins auprès du patient

- En cas de retour prévu avec le patient (après un examen p.ex), prévoir une surblouse de rechange en tous les cas

**Concerne le collaborateur (brancardier\* ou médico-soignant) en soutien au transport**

Rester en tenue professionnelle habituelle

Mettre le masque ultrafiltrant et la protection oculaire

Pratiquer l'hygiène des mains au besoin (lorsque les mains passent du lit vers l'environnement hospitalier au moins)

Rester au pied du lit

Conduire le lit, commander l'ascenseur et l'ouverture des portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)

S'assurer que seules les personnes impliquées dans le transport du patient se trouvent dans l'ascenseur, s'il est utilisé

Demander à toute personne se trouvant sur le trajet de s'écarter

\* Le brancardier n'entre pas en chambre