

COVID-19 Séquence d'enfilage des équipements de protection de personne – pour la prise en soin du patient COVID-19

Pour entrer en chambre

1. Masque médical (type II R) :



a) Hygiène des mains

b) Masque médical
ou

Masque ultrafiltrant (FFP2) en situation à risque
d'aérosolisation* de sécrétions respiratoires ; test
d'étanchéité pour le masque ultrafiltrant

2. Protection oculaire :



3. Surblouse :

- Attachée au col et à la taille ; pans
croisés et couvrant le dos



En chambre et uniquement pour les soins au patient

4. Hygiène des mains :

- Avant d'enfiler les gants
- Selon les 5 indications de l'OMS



5. Gants de soins :

- A retirer / changer en cas
d'indication de l'hygiène des mains



*Situation à risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires

Frottis naso-pharyngé, bronchoscopie, aspiration trachéale, intubation, extubation, trachéotomie, échographie trans-oesophagienne, gastroscopie, ventilation manuelle, réanimation cardio-pulmonaire, et autres procédures similaires, pose et retrait de l'assistance ventilatoire ;

En cas d'intervention auprès du patient pendant la durée d'assistance ventilatoire (CPAP, ventilation non invasive ou oxygénation à haut débit (Airvo)), auprès du patient trachéotomisé

Remarque :

- le masque médical / ultrafiltrant et la protection oculaire peuvent être maintenus en place même en dehors de la chambre du patient
- tout équipement de protection souillé doit être retiré / changé

COVID-19 Séquence de retrait des équipements de protection de personne

Avant la sortie de chambre

1. Préparation

Défaire l'attache de la surblouse au niveau de la taille



2. Retrait non contaminant des gants



a) Pincer un gant au niveau de la paume ; le retirer ; le garder dans la main gantée

b) Glisser 1-2 doigts de la main dégantée sous le poignet du deuxième gant ; retirer le gant en le retournant et en enveloppant le 1^{er} gant

c) Eliminer

d) Hygiène des mains

3. Retrait non contaminant de la surblouse



a) Glisser les mains sous le col et défaire l'attache à la nuque


b) Retirer la surblouse vers l'avant en la repliant sur elle-même

c) Enrouler la surblouse par sa face interne (les mains sont en contact avec la face interne de la surblouse) ; éliminer la surblouse

d) Hygiène des mains

En dehors de la chambre

4. Retrait de la protection oculaire – lorsqu'il n'y a plus d'indication à le porter (e.g. pause ; sortie d'unité)



*En l'absence de souillure la protection oculaire est désinfectée par application de Des-Sur®
En cas souillure la protection oculaire (type Faceview) est éliminée*



a) Par les côtés et vers l'avant

b) Hygiène des mains

5. Retrait du masque médical ou ultrafiltrant (FFP2) – lorsqu'il n'y a plus d'indication à le porter



a) Par les attaches et vers l'avant

b) Hygiène des mains