

Gestion de l'équipement de protection de personne et du transport

- Transfert du patient COVID-19 instable, avec assistance ventilatoire invasive (patient intubé)

Concerne les professionnels médico-infirmiers qui interviennent dans les soins au patient pendant le transfert (injection, ventilation p.ex)

Pratiquer l'hygiène des mains et le changement de gants

Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la protection oculaire & la surblouse

Rester à la tête du patient

Ne rien toucher dans l'environnement hospitalier pendant le transport

Une fois arrivés à destination et après installation du patient: retirer la surblouse et les gants et pratiquer l'hygiène des mains ; maintenir le masque et la protection oculaire en place

En cas de retour prévu avec le patient (après un examen p.ex); prévoir une surblouse de rechange (les gants de soins sont disponibles partout)

Concerne le collaborateur (brancardier* ou médico-soignant) en soutien au transport

Rester en tenue professionnelle habituelle

Maintenir le masque médical en place

Pratiquer l'hygiène des mains au besoin (lorsque les mains passent du lit vers l'environnement hospitalier au moins)

Rester au pied du lit

Conduire le lit, commander l'ascenseur et l'ouverture des portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)

* Le brancardier ne rentre pas en chambre

Gestion de l'équipement de protection de personne et du transport

- Transfert du patient instable COVID-19, avec ventilation non invasive (VNI; CPAP; [OHD](#))

Concerne les professionnels médico-infirmiers qui interviennent dans les soins au patient pendant le transfert (injection, ventilation p.ex)

Pratiquer l'hygiène des mains et le changement de gants

Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la protection oculaire & la surblouse

[Mettre un masque médical au patient sous oxygénothérapie à haut débit \(OHD\)](#)

Rester à la tête du patient

Ne rien toucher dans l'environnement hospitalier pendant le transport

Une fois arrivés à destination et après installation du patient: retirer la surblouse et les gants et pratiquer l'hygiène des mains ; maintenir le masque et la protection oculaire en place

En cas de retour prévu avec le patient (après un examen p.ex); prévoir une surblouse de rechange (les gants de soins sont disponibles partout)

Concerne le collaborateur (brancardier* ou médico-soignant) en soutien au transport

Rester en tenue professionnelle habituelle

Mettre le masque ultrafiltrant et la protection oculaire

Pratiquer l'hygiène des mains au besoin (lorsque les mains passent du lit vers l'environnement hospitalier au moins)

Rester au pied du lit

Conduire le lit, commander l'ascenseur et l'ouverture des portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)

S'assurer que seules les personnes impliquées dans le transport du patient se trouvent dans l'ascenseur s'il est utilisé

Demander à toute personne se trouvant sur le trajet de s'écarter

* Le brancardier ne rentre pas en chambre