

## COVID-19 Séquence d'enfilage des équipements de protection de personne – pour la prise en soin du patient COVID-19

### Pour entrer en chambre

#### 1. Masque médical (type II R) :



a) Hygiène des mains

b) Masque médical

#### 2. Surblouse :

- Attachée à la taille et au col



### Pour les soins directs au patient

#### 3. Hygiène des mains :

- Avant d'enfiler les gants
- Selon les 5 indications de l'OMS



#### 4. Gants de soins :

- A retirer / changer : en cas de souillure et en cas d'indication de l'hygiène des mains



\*\*\*

### En situation à risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires

Frottis naso-pharyngé, bronchoscopie, aspiration trachéale, intubation, extubation, trachéotomie, échographie trans-oesophagienne, gastroscopie, ventilation manuelle, réanimation cardio-pulmonaire, et autres procédures similaires, pose et retrait de l'assistance ventilatoire ;

En cas d'intervention auprès du patient pendant la durée d'assistance ventilatoire (CPAP, ventilation non invasive ou oxygénation à haut débit (Airvo)), auprès du patient trachéotomisé

### Pour entrer en chambre

#### 1. Masque ultrafiltrant (FFP 2) :



a) Hygiène des mains

b) Masque ultrafiltrant (FFP2)

#### 2. Protection oculaire :



#### 3. Surblouse :

- Attachée à la taille et au col



### Pour les soins directs au patient

#### 4. Hygiène des mains

- Avant d'enfiler les gants
- Selon les 5 indications de l'OMS



#### 5. Gants de soins

- A retirer / changer : en cas de souillure et en cas d'indication de l'hygiène des mains



## COVID-19 Séquence de retrait des équipements de protection de personne

### Avant de sortie de chambre

#### 1. Préparation


Défaire l'attache de la surblouse au niveau de la taille



#### 2. Retrait non contaminant des gants



Pincer un gant au niveau de la paume ; le retirer ; le garder dans la main gantée



a) Glisser 1-2 doigts de la main dégantée sous le poignet du deuxième gant ; retirer le gant en le retournant et en enveloppant le 1<sup>er</sup> gant



b) Eliminer



c) Hygiène des mains

#### 3. Retrait non contaminant de la surblouse



a) Glisser les mains sous le col et défaire l'attache à la nuque



b) Retirer la surblouse vers l'avant en la repliant sur elle-même




c) Enrouler la surblouse par sa face interne (les mains sont en contact avec la face interne de la surblouse) ; éliminer la surblouse



d) Hygiène des mains

### En dehors de la chambre

#### 4. En cas de port de protection oculaire : Retrait de la protection



a) Par les côtés et vers l'avant



*En l'absence de souillure la protection oculaire est désinfectée par application de Des-Sur®  
En cas souillure la protection oculaire (type Faceview) est éliminée*



b) Hygiène des mains

#### 5. Retrait du masque médical ou ultrafiltrant (FFP2)



a) Par les attaches et vers l'avant



b) Hygiène des mains

